

Россия,
190103, Санкт-Петербург
ул. 11-ая Красноармейская д13 кв 7
ИНН 7839318319/КПП 783901001
Р/сч 40702810400000009204
к/с 30101810000000000852
БИК 044030852



Тел +7(812) 251-1028
Факс +7(812) 407-5630
e-mail : info@vagincentre.com
www.vagincentre.com

Рецензия

на метод безоперационного лечения межпозвонковых грыж

От руководителя проекта реабилитационного центра «ОЛМЕ» в г. Санкт-Петербурге,
врача-нейрохирурга с 25 летним стажем работы, кандидата медицинских наук,
Вагина Александра Анатольевича.

Лечение межпозвонковых грыж в медицине в настоящее время является сложной проблемой. Во-первых, не существует универсального метода лечения грыжи позвоночника. Лечение межпозвонковой грыжи в настоящее время занимаются и неврологи, и нейрохирурги, и вертебрологи, физиотерапевты, мануальные терапевты и врачи других специальностей. Во-вторых, все еще нет единого мнения в медицинском сообществе как и какими способами лечить это заболевание. Имеется два принципиально разных подхода в лечении грыжи позвоночника: консервативное и оперативное лечение.

Многие специалисты считают, что вылечить грыжу позвоночника без операции на ранних стадиях вообще проще и менее затратно, чем бороться с рецидивными послеоперационными грыжами и другими послеоперационными осложнениями. По данным ВОЗ показания к оперативному лечению межпозвонковых грыж отмечено не более чем у 1% всех больных с грыжами.

Общеизвестно, что рецидив грыжи дисков встречаются чаще в первые два года после операции. Дегенеративный стеноз, как в изолированном виде, так и в сочетании с грыжей оперированного диска, чаще встречается в более поздние сроки. А.Е. Симонович и соавт. установили, что среди всех возникающих осложнений развитие рецидивов в сроки до года после проведенной операции происходит у 47,7% случаев, в сроки от года до пяти лет — у 44,3%. Реклама лазерных технологий, как инновационных методик, часто только повышает число больных и инвалидов с вертеброгенными синдромами.

Операций по поводу межпозвонковых грыж предложено множество. Известно, что если для устранения причины болезни используется много способов, значит либо не найдено надежных, либо осложнения после разных операций наступают часто.

К осложнениям после операций по поводу межпозвонковых грыж относятся:
Быстрое прогрессирование после операций остеохондроза и развитие протрузий и грыж выше и нижележащих межпозвонковых дисков;

- рубцовый и спаечный процесс;
- рецидивирование межпозвонковых грыж;
- эпидурит;
- парез и параличи верхних и нижних конечностей;
- нарушение функций тазовых органов;
- спондилит, остеомиелит позвоночника.

Как следует из вышеизложенного, сама операция и послеоперационные осложнения действительно в некоторых случаях могут еще больше утяжелять состояние больного после вмешательства по сравнению с исходным.

Однако не стоит забывать, что есть случаи, когда оперативное лечение просто необходимо при межпозвонковых грыжах. И в таком разе следует упомянуть об абсолютных показаниях к оперативному лечению грыж позвоночника:

- параличи конечностей;
- парезы и параличи сфинктеров прямой кишки и мочевого пузыря;
- выраженный болевой синдром, неподдающийся лечению и отсутствие тенденции к купированию болевого синдрома в течение 2-х недель при размере грыжи более 7 мм,